

Servicio de Terapia Anticoagulante
Indicaciones para los pacientes y familiares
Rivaroxaban (Xarelto®)

Rivaroxaban (Xarelto®) es recetado para el tratamiento y prevención de la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. A este tipo de medicamento se le conoce como anticoagulante. Es recetado para:

- Disminuir el riesgo a accidentes cerebro vasculares y la formación de coágulos sanguíneos causados por la fibrilación auricular;
- El tratamiento de coágulos sanguíneos en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda) o en los pulmones (embolia pulmonar), y para disminuir el riesgo a que reaparezcan.
- Previene la formación de coágulos después de una cirugía de artroplastia (reemplazo) de cadera o rodilla.

NO SUSPENDA ESTE MEDICAMENTO sin antes consultar con el médico que lo recetó.

Este medicamento NO puede ser recetado para personas con una válvula cardíaca artificial.

Contacte a su médico si tiene alguna pregunta o si presenta efectos secundarios con este medicamento rivaroxaban (Xarelto®).

Su médico: _____ N° de teléfono: _____

CÓMO y CUÁNDO tomar el rivaroxaban (Xarelto®)

Tome su dosis **diaria con comida. Siga las indicaciones del médico.** Este medicamento está disponible en diferentes tamaños, figuras y colores. Asegúrese de conocer bien el tamaño, la figura y la dosis indicada.

- Para la mayoría de las personas con fibrilación auricular la dosis es de 20 mg una vez al día **con comida.**
- Para el tratamiento de coágulos sanguíneos, la dosis durante los *primeros 21 días* es de 15 mg **dos veces al día con comidas**, después para el resto del tratamiento tome 20 mg **una vez al día con comidas.**
- Para reducir el riesgo a que se repita la formación coágulos sanguíneos después del tratamiento inicial, la dosis es de 20 mg una vez al día **con comida.**
- Para prevenir la formación de coágulos después de una cirugía de artroplastia de cadera o rodilla la dosis es de 10 mg una vez al día con o sin comida (cadera – 35 días; rodilla – 12 días).
- Su dosis puede ser diferente dependiendo de la función renal y los otros medicamentos que usted tome.

NO suspenda el uso de este medicamento. Tómelo cumpliendo con el horario establecido. Procure renovar la receta a tiempo. De lo contrario, podría incrementar el riesgo a la formación de coágulos sanguíneos.

- Si se le olvidó tomar una dosis, tómesela tan pronto se acuerde ese mismo día. Avísele a su médico si omitió una dosis. Al siguiente día continúe con su dosis recetada. **No tome** dos dosis al mismo tiempo. *Excepción: si toma rivaroxaban para los coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones, puede tomar 2 dosis al mismo tiempo para compensar por la dosis omitida.*

Omitir una dosis puede aumentar su riesgo a formar coágulos de sangre.

- Contacte a su médico si presenta problemas con los riñones, ya que es posible que sea necesario un cambio en el tratamiento.
- Si lo van a operar o le realizarán algún procedimiento médico o dental (particularmente con la anestesia espinal o epidural), comuníquese con el médico que le recetó rivaroxaban. Usted deberá suspender este medicamento por un corto tiempo.

EFFECTOS SECUNDARIOS del rivaroxaban (Xarelto®)

- Este medicamento puede causar sangrado
- Las cortadas pueden sangrar por un tiempo más largo. Los moretones pueden aparecer con mayor facilidad. Esto es normal.
- Otros efectos secundarios pueden abarcar: dolor de cabeza, dolor muscular o espasmos, mareos, picazón en la piel o reacciones alérgicas. Avísele a su médico sobre los efectos secundarios que le producen malestar.

LLAME A SU MÉDICO u obtenga ayuda médica de urgencia llamando inmediatamente al 911 si usted presenta:

- Síntomas de alguna reacción alérgica como dolor de pecho u opresión, hinchazón en la cara o en la lengua, problemas para respirar o siente que se va a desmayar.
- Si sangra a través de la boca, nariz o las encías.
- Si presenta sangre o coágulos de sangre en el esputo después de toser.
- En las mujeres, sangrado a través de la vagina o flujo menstrual más abundante de lo habitual.
- Vómito con sangre o con aspecto parecido al poso del café.
- Heces fecales rojizas o negras (como el alquitrán).
- Orina de color rosada o marrón oscura.
- Moretones que aparecen más de lo habitual o sin motivo aparente.
- Dolores de cabeza inusuales o dificultad para pensar o hablar.
- Cualquier debilidad o adormecimiento en la cara, brazos o piernas.

- Dolor repentino y/o hinchazón (por ejemplo, dolor de cabeza o en las articulaciones).
- Una mala caída o lesión, especialmente si se golpea la cabeza.

Información importante que debe conocer al tomar rivaroxaban (Xarelto®)

- Avísele a todos sus médicos, dentistas y otros proveedores de atención médica que usted toma este medicamento.
- Problemas renales o problemas del hígado pueden afectar a este medicamento. Si tiene este tipo de problemas, avísele a su médico que le recetó rivaroxaban. Puede ser necesario un examen de sangre de forma periódica para revisar esto.
- Al surtir una nueva orden, o cuando toma medicamentos de venta libre o hierbas medicinales, pregúntele al farmacéutico para asegurarse que no hay ningún peligro o contraindicación mientras toma rivaroxaban.
- Ciertos medicamentos pueden alterar el efecto que tenga este medicamento [por ejemplo, ketoconazol (*Nizoral®*), itraconazol (*Onmel™, Sporanox®*), ritonavir (*Norvir®*), lopinavir/ritonavir (*Kaletra®*), indinavir (*Crixivan®*), rifampicina (*Rifater®, Rifamate®, Rimactane®, Rifadin®*), carbamazepina (*Carbatrol®, Equetro®, Tegretol®*), fenitoína (*Dilantin®*), o St. John's wort (hipérico, (*Hypericum perforatum*))].
- Ciertos medicamentos pueden aumentar su riesgo a sangrar mientras toma rivaroxaban [por ejemplo: aspirina, antiinflamatorios no esteroides AINES (*Motrin®, Advil®, Naprosyn®*), heparina, warfarina, bisulfato de clopidogrel (*Plavix®*), prasugrel (*Effient®*)].
- Lleve consigo una lista que incluya todos los medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre y las hierbas medicinales que toma. Comparta esta lista con todos sus médicos y proveedores de atención médica.

Uso de rivaroxaban (Xarelto®) durante el embarazo y el amamantamiento

- No hay estudios que confirmen si el uso de este medicamento es seguro durante el embarazo.
- Es muy importante que le avise a su médico si está embarazada o tiene planeado estarlo.
- No se sabe si este medicamento pasa a través de la leche materna. Se recomienda que suspenda este medicamento o pare de amamantar. **Hable con su médico antes de suspender el uso de este medicamento.**